


in situ	Conduta
Carcinoma <i>in situ</i>	Conização
Adenocarcinoma <i>in situ</i>	Piver I

Tipos de Cirurgia	
Piver I	Histerectomia (corpo e colo)
Piver II	Histerectomia + Paramétrio até cruzamento do ureter + 1/3 superior da vagina + Linfadenectomia pélvica
Piver III (ou Wertheim-Meigs ou Histerectomia Radical)	Histerectomia + todo o paramétrio + 1/3 superior da vagina + Linfadenectomia



Estadiamento e Tratamento		
	Estadiamento	Tratamento
IA1	< 3 mm	Piver I ou Conização (se mulher sem prole)
IA2	3 - 5 mm	Piver II ou Traquelectomia + Linfadenectomia (se mulher sem prole)
IB1	≤ 2 cm	Piver III
IB2	2 - 4 cm	Piver III
IB3	> 4 cm	QT + RT
IIA1	2/3 superiores da vagina, ≤ 4 cm	Piver III
IIA2	2/3 superiores da vagina, > 4 cm	QT + RT
IIB	Paramétrios	QT + RT
IIIA	1/3 inferior da vagina	QT + RT
IIIB	Paramétrio até parede pélvica ou Compressão do ureter com repercussão renal	QT + RT
IIIC	Metástase para linfonodo pélvico ou paraórtico	QT + RT
IVA	Invasão bexiga ou reto	QT + RT
IVB	Metástase a distância	QT + RT

QT = Quimioterapia; RT = Radioterapia

