in situ

	Conduta
Carcinoma *in situ*	Conização
Adenocarcinoma *in situ*	Piver I

Tipos de Cirurgia

Piver I	Histerectomia (corpo e colo)
Piver II	Histerectomia + Paramétrio até cruzamento do ureter + 1/3 superior da vagina + Linfadenectomia pélvica
Piver III (ou Werthe-im-Meigs ou Hister-ectomia Radical)	Histerectomia + todo o paramétrio + 1/3 superior da vagina + Linfadenectomia

Estadiamento



Estadiamento e Tratamento

	Estadiamento	Tratamento
IA1	< 3 mm	Piver I ou Conização (se mulher sem prole)
IA2	3 - 5 mm	Piver II ou Traquelectomia + Linfadenectomia (se mulher sem prole)
IB1	≤ 2 cm	Piver III
IB2	2 - 4 cm	Piver III
IB3	> 4 cm	QT + RT
IIA1	2/3 superiores da vagina, ≤ 4 cm	Piver III
IIA2	2/3 superiores da vagina, > 4 cm	QT + RT
IIB	Paramétrios	QT + RT
IIIA	1/3 inferior da vagina	QT + RT
IIIB	Paramétrio até parede pélvica ou Compressão do ureter com repercussão renal	QT + RT
IIIC	Metástase para linfonodo pélvico ou paraórtico	QT + RT
IVA	Invasão bexiga ou reto	QT + RT
IVB	Metástase a distância	QT + RT

QT = Quimioterapia; RT = Radioterapia

By **Ana Paula** (AnaPLopes)
cheatography.com/anaplopes/

Published 11th August, 2022.
Last updated 7th January, 2024.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com