

### NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etiologia  | Fármacos = diuréticos; rifampicina; IBP; ATB (beta--lactâmicos); AINES; sulfa |
| QC         | IRA oligúrica + febre + dor lombar + rash cutâneo                             |
| EAS        | Hematúria não dismórfica + proteinúria não nefrótica + eosinofilia            |
| Tratamento | Suspender fármaco + corticoide s/n                                            |

### NECROSE DE PAPILA

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Etiologia | Pielonefrite; anemia falciforme; obstrução; DM; analgésicos |
| QC        | Febre + dor lombar + hematúria                              |
| Dx        | Urografia excretora = sombras em anel                       |

### NECROSE TUBULAR AGUDA

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Obstrução do túbulo pelas células necrosadas que se desprendem                     |
| Etiologia               | Isquemia (choque ou contraste iodado) ou toxina (aminoglicosídeos ou rabdomiólise) |
| Tratamento              | Suporte → o túbulo regenera em cerca de 7-21 dias                                  |
| Diagnóstico diferencial | NTA x IRA pré-renal                                                                |

### NTA x IRA PRÉ-RENAL

|              | IRA PRÉ-RENAL                                                                                                                                          | NTA                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              | Não está chegando o sangue no rim, porém o que chega o túbulo está exercendo sua função, ou seja, a urina está concentrada e houve reabsorção de sódio | Túbulo perdeu sua função, ou seja, a urina está diluída e não absorveu sódio |
| Na Urinário  | Baixo (<20)                                                                                                                                            | Alto (>40)                                                                   |
| FeNa         | Baixo (<1%)                                                                                                                                            | Alto (>1%)                                                                   |
| Densidade    | Alta (>1020)                                                                                                                                           | Baixa (<1015)                                                                |
| Osmolaridade | Alta (>500)                                                                                                                                            | Baixa (<350)                                                                 |
| Cilindros    | Hialinos                                                                                                                                               | Granuloso ou epitelial                                                       |