

Epidemiologia e Fatores de Risco

Epidemiologia	Neo mais comum TGI Maior taxa de mortalidade em PT Redução da mortalidade por novas medidas
Fatores de Risco	Não modificáveis (idade, hx pessoal, DII, hx familiar) e síndromes hereditárias: lynch paf e peutz-jaghers) Modificáveis (dieta_ mt carne vermelha e pouca fibra; estilo de vida;)
Fatores Protetores	fruta vegetais e fibras; micronutrientes (Ca, selênio, vit A,C,D,E) folato e melatonina AINES e reposição hormonal pós-menopausa

Rastreio

PSOF	Testes imunistoquímicos: se negativo repete em 2 anos; se positivo colonoscopia no max em 8 semanas
Colonosopia	quando é realizada: PSOF +, sinais ou sintomas, antecedentes familiares ou pessoais de: adenoma, CCR, DII, síndromes hereditárias
	Normal - repete em 10 anos; sem necessidade de PSOF por 5 A; Se não foi otimizada repetir no max em 1 ano
	Impossibilidade de realizar por: 1. intolerância ou preparação incompatível: repete em 90 dias. 2. Se por estenose inultrapassável consulta de gastro em 60 d

Rastreio (cont)

	Anormal - cancro ou pólipos malignos: consulta de gastro em 30d pólipos com risco de excisão não hospitalar ou >10 pólipos ou DII - gastro em 60d prioritário
Idade de início de diagnóstico	Antecedentes familiares: 40A ou 10A antes do dx no fam, EDB 5/5 DII: ao dx + 8-12A após; a cada 1-5 anos dependendo do risco PAF: 10-12 A, sigmoidoscopia flexível anual PAF atenuada 20 A CCR hereditário não polipoide: 20-25 anos ou 10 anos antes do fam mais jovem

Quem Realiza: assintomáticos e sem fatores de risco 50-74 anos
Quem tem sx e sinais sugestivos segue lg para colonoscopia total

Patogénese

CCR esporádico	Maioria
Hereditário	PAF (atenuada) Lynch e familiar
Polipos neoplásicos	adenomatosos (displásicos), com risco crescente de malignidade (tubulares < tubulovilosos < vilosos) Pediculados Sésseis
Outros	Hiperplásicos (não pré-malignos) Hamartomas (infância, geralmente não pré-malignos) (síndrome P-J) Serreados (risco de Ca. invasivo) Inflamatórios (não pré-malignos, associaod DII)



Patogénese (cont)

Genética	ativação oncogenes K-RAS inativação sup tumorais (APC, p53) Instabilidade cromossómica (PAF ex; + Esq) Inst Microsatélites (Lynch, ++ Dto)
-----------------	---

Clínica

Cólon dto	Massa palpável nos QDs; Hemorragia com melenas; défice de ferro e anemia; Diarreia por hiperssecreção de muco
------------------	---

Colón Esq	Cólica, Alt hábitos intestinais, hematoquezias ou retorragias, obstrução
------------------	---

Reto	Tenesmo, dor, diminuição calibre fezes, falsa vontade, retorragias, flatulência ou incontinência fecal
-------------	---

Sx constitucionais

Metastases

<i>Hepáticas</i>	ascite, hepatomegalia, dor, icterícia e anorexia
------------------	--

<i>Pulmonares</i>	dispneia, tosse, hemoptises, derrame
-------------------	--------------------------------------

<i>peritoneais</i>	ascite, distensão abdominal e dor; obstrução intestinal
--------------------	--

Diagnóstico

Exame físico com toque retal

Colonoscopia

Sigmoidoscopia flexível se hematoquezias escassas e intermitentes
num doente com <40 anos, sem fatores de risco nem sinais de
alarme

Colonografia TC

Enema bário com duplo contraste

Lab Marcadores tumorais como CEA e CA 19-9 (+ para prognó-
stico e acompanhamento, menos p dx)

Estadiamento

envolvimento ganglionar regional

estadio T: preditor da invasão ganglionar regional

estadio N: preditor de doença metastática e sobrevida

Colon fígado e pulmão

Reto Superior: Fígado;
Inferior: Pulmão e osso

Estádios TNM relacionase com sobrevida a 5 anos

1: Restrito à submucosa ou muscular, sem invasão ganglionar

2: Invade muscular e subserosa (T3) ou órgãos e tecidos (T4) sem
invasão ganglionar

3: Qualquer T com invasão ganglionar

4: qualquer T e N com metastatização à distância

Exames

TC-TAP; RMN; PET-CT com 18F-FDG

Retoscopia rígida no retal + ecoendoscopia retal (locorregional)+
RMN pélvica (fascia mesorretal)

Tratamento

In situ Basta a recessão
endoscópica

Estadio 1 Ver características
histológicas

Alterações confinadas no polipo sem
fatores desfavoráveis (pode ter invasão
da submucosa) Recessão endoscópica
com seguimento
adequado

Presença de Fator desfavorável Recessão cirúrgica com
remoção de ganglios
linfáticos
Se comorbilidades
colonoscopia de
vigilância aos 6m

Estadio 2

Não podem ser ressecados por colonoscopia logo necessitam de
recessão cirúrgica do segmento intestinal e drenagem linfática (pelo
menos 12 ganglios p diferença estadio 2 e 3)

Estadio 3

Recessão cirúrgica alargada e anastomose (se risco de neo mt
aumentado, colectomia total)

Tratamento (cont)

QTx adjuvante em tds os elegíveis, idealmente até 12s pós cx
(nunca dps de 6m)

Estadio 2 + De Garamond (Leucovorina + 5-FU) 6m

Risco Capecitabina 6m

intermédio

Risco alto e 3 FOLFOX (leuco + 5fu + oxaliplatina) 6m

CAPOX (capecitabina + oxaliplatina) 3 a 6m

Mutação PI3K pode beneficiar de AAS

Estadio 4: metastizado

(esquemas)

Infusão 5FU ou via oral

Alternativa com capecitabina (tb fluoropirimidina)

FOLFOX / FOLFIRI (em vez de oxaliplatina é 5FU/LV/irinotecano)

Terapia dirigida VEGF Bevacizumab

(monotx ou EGFR Cetuximab ou Panitumumab NOTA: estes

associado a só se RAS wild type e tipicamente mais eficaz no

Qt) colon esq (nas outras usar beva)

Ressecar metastases quando possível, se não, tentar diminuir p
tornar ressecável (downsizing).

Follow up



By **Beatriz_A_O**

cheatography.com/beatriz-a-o/

Published 17th December, 2023.

Last updated 17th December, 2023.

Page 3 of 3.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**

Learn to solve cryptic crosswords!

<http://crosswordcheats.com>