

Bakgrunnur		Greining brjóstakrabbameins (cont)		Fleygskurður	
<b>Sjúklingahópar brjóstamiðstöðvar</b>		Veita heilðræna þjónustu með öflugri teymisvinnu fyrir einstaklinga með sjúkdóma í brjóstum		<b>Stærð</b>	Minnsta inngripið.
Krabbamein í brjóstum		Samþætta og stuðla að samfellu í þjónustu og auka þannig öryggi sjúklinga		<b>inngrips</b>	Dagaðgerð
Góðkynja sjúkdómar í brjóstum		Auðvelda aðgengi einstaklinga með sjúkdóma í brjóstum að þjónustu		<b>Verkir</b>	Litlir verkir: Paratabs og Cel-ebra í nokkra daga
Aukin áhætta á krabbamein í brjóstum		<b>Hlutverk hjúkrunarfræðings við greiningu</b>		<b>Auka geislameðferð</b>	
Uppbygging á brjóstum		Stuðlar Samféllu + góðu aðgengi að að þjónustu		Meðferðar- lengd	1-3 vikur
<b>Tölfræði og staðreyndir</b>	Brjóstakrabbamein	Einstaklingsmiðuð þjónusta		Fjöldi skipta	Eftir tegund sjúkdóms
Algengi	Algengasta cancer kvenna; 1/9 konum á ári	Veitir stuðning		Tíðni	Hverjum virkum degi
Greining á ári	240	Sér um fræðslu við greiningu og fyrir aðgerð		Byrjun meðferðar	6-8 vikum eftir aðgerð; (4.vikum frá lyfjameðferð e- f hún var gefin eftir aðgerð)
Meðaldur við greiningu	62 ár (67 ár hjá körlum)	Eftirlit eftir aðgerð		<b>Fleygð-skurður með minnkunar-tækni</b>	Stór brjóst minnkuð. Heilbrigða brjóstið einnig minnkað.
Erfðir	<10% skýrist af arfgengum genabreytingum	Tengiliður		<b>Eftir aðgerð</b>	
Tegundir	Margir mismunandi sjúkdómar	<b>Aðgerðir vegna brjóstakrabbameins</b>		Eftirlit hjá brjóstaskurðlækni 2 vikum eftir aðgerð. Eftirlit hjá hjúkrunarfræðing eftir þörfum. Frá vinnu í 3 vikur.	
Aðalmeðferð	Skurðaðgerð	<b>Fleygskurður</b>	Ef hægt, þá ráðlagt.		
Auka meðferðir	Geislameðferð, lyfjameðferð, andhor- mónameðferð	<b>Brjóstnám</b>	Engin uppbygging		
<b>Greining brjóstakrabbameins</b>		Tafarlaus uppbygging	Ef hægt, þá boðið		
<b>Sýni tekið til greiningar</b>	Sýnataka	Síðbúin uppbygging			
1. Kona endurinnkölluð úr hópleit		<b>Aðgerð á holhandareitlum</b>			
2. Hnútur þreifast (beiðni frá heimilislækni)		Varðeitilstaka	Til að taka sýni á		
<b>Þegar grunur um krabbamein</b>		Holhandarhreiðing	(ef þekkt meinvörp í - holhönd)		
„Biðin er verst“ (óvissa)		<i>Því stærri aðgerð, þeim mun meiri hætta á fylgikvillum</i>			
„Í lausu lofti“					
Streita					
<b>Markmið brjóstamiðstöðvar</b>					

