

### Skilgreiningar

Húðtök- usvæði (donor site)	Svæðið þar sem húðin var tekin
Húðágr- æðsla- split skin graft (transplant)	Svæðið þar sem nýja húðin var sett
Notkun húðágr- æðsla í bruna	Fyrirbyggja frekara vökvatap, minnka líkur á sýkingum og takmarka hitatap

### Ástæður húðágræðslu

Bruni	Djúpir hlutþykktarbrunar + fullþykktarbrunar
-------	---

### Illkynja húðæxli

Vegna húðsjú- kdóma	Hidradentitis Suppurativa
---------------------------	---------------------------

Til að loka sárum sem tekur langan tíma að gróa	Slys og áverkar Krónísk fótasár ( athuga blóðflæði fyrst!)
---	--

Til að loka skurðum	fasciotomy
------------------------	------------

### Til að fjarlægja húðflúr

### Tegundir húðgjafa

Autografts	Eigin húð
Hemografts	húð frá öðrum- ættingjar geta t.d. gefið húð
Xenografts	húð frá t.d. svínunum- er notað í stórum brunum þegar ekki er hægt að nota húð frá sjúklingi eða ættingjum

### Húðágræðsla

#### Val á húðtökusvæði

Mikilvægt að velja svæði þar sem litur og áferð á húðinni passar saman. Setur helst ekki húð af læri í andlit

#### Skilyrði húðágræðslusvæðið

Nægjanlegt blóðflæði

Laust við sýkingar

Leggjast vel að sárinu	Svo blóð og vessi safnist ekki á milli
---------------------------	---

Húðágr- æðslan þarf að vera stöðug	Búa vel um með umbúðum. Rúmlega ef aðgerð er á neðri útlimum
---	--

#### Umbúðir

Skiptar skoðanir meðal heilbrigðismanna  
hve bestu umbúðirnar eru

Aquacel og svampar einna bestu  
umbúðirnar

### Hjúkrun eftir húðágræðslu

Tegundir	Vaselín umbúðir eða svampur
----------	--------------------------------

#### Umhirða umbúða

Ekki hreyfðar í 5 daga

Teknar varlega - ágrædda húðin er mjög  
viðkvæm

Látid lofta í 30 mínútur

Umfram húð er klippt í burtu

Fjarlægja hematom	ef það hefur safnast undir húð
----------------------	-----------------------------------

Hefti fjarlægð samkvæmt fyrirmælum  
læknis.

Oftast byrjað á því að fjarlægja annað hvert  
hefti

Halda áfram með vaselíngrisjur + þurrar  
grisjur yfir.

Fluffa grisjur til að fylla sár

Vefja létt með gifsbómull og teygjubindi

#### Sáraskipting á húðtökusvæði með gataðri filmu

Götuð filma og þurrar grisjur yfir

### Hjúkrun eftir húðágræðslu (cont)

Fyrsta sólahr- til að minnka blæðingu.  
inginn að hafa

þrýsting á  
svæðinu

Fylgjast með hvort blæði í grisjur,

Skipta á en láta filmuna óhreyfða  
blóðugum  
grisjum

Filman skal látin óhreyfð þar til húðtök-  
usvæði er nærri gróið

Rakakrem eða vaselín daglega þegar svæði  
gróið og filma tekin

#### Sáraskipting á húðtökusvæði með vaseli- ngrisjum

Umbúðarst- Vaselín grisjur → þurrar  
igveldið grisjur → gipsbómull →  
teygjubindi

Lausar 1-2 dögum eftir aðgerð,  
umbúðir grisja höfð yfir, tubifast eftir  
fjarlægðar það

Húðtök- Látta lofta í 1-2x á dag  
usvæðið þurrkað upp

Umbúðir Alls ekki rífa fastar grisjur  
þynntar úr sári, klippa allt laust jafn  
óðum, bera vaselín allt í  
kring

### Verkir

Frekar í húðtökusvæði en húðágræðslu

Fer mikið eftir Rök ságræðsla /  
umbúðum vaselíngrisjur

Minnst verkir hjá umbúðum sem tryggja  
raka sárgræðslu

Mest verkir ef vaselíngrisjur yfir húðtök-  
usvæði

### Misheppnuð húðágræðsla

#### Helstu ástæður fyrir því að húðágræðsla misheppnast

Blóð, loftbólur, fita eða drep eru fyrir á húðágræðslusvæðinu

Röng meðhöndlun eða áverkar við umbúðaskipti

Blæðing

Bjúgur

Sýking

#### Ef merki um sýkingu

Taka stök og hafa samband við lækni

Láta lofta 1-2 á dag ca 1 klst í senn

Acetic acid (Edik) eða prontosan bakstrar.

Oftast loftfælnar bakteríur

### Hreyfing eftir húðágræðslu

Húðágræðsla á neðri útlimum Rúmlega í 5-7 daga

Hjólástóll og hreyfing Hreyfing úr rúmi í hjólástól með fjöl/fótstigi sem stendur beint úr frá hjólástól

Hagræðing Útlimumur í hálegu til að draga úr bjúg

Staða Fótleggur er alveg beinn og fótleggjar má ekki "hanga"

Mobili-  
sering Gert í smáum skrefum

1. Byrjar á því að láta fótlegg hanga x 3 á dag

2. Ganga stuttvegalemdir með vöfnu teygjubindi (frá tábergi eða hné)

### Hreyfing eftir húðágræðslu (cont)

Teygju- Notuð fyrir hreyfingu til að bindi frá styðja við húðágræðsluna og hendi að koma í veg fyrir bjúg öxl

Fer svo að ganga stuttarvegalemdi og þá er mikilvægt að vefja með teygjubindi frá tábergi að hné eða frá hendi að öxl fyrir hreyfingu til að styðja við húðágræðsluna og koma í veg fyrir bjúg

### Varúð

Húðágræðslan og húðtökusvæðið þarf að vera fyrir:

*Hita, kulda, áverkum og sólarljósi*

Hiti og kuldi sérstaklega slæm

Sól ætti ekki að skína á örvef í allt að ár eftir aðgerð

Bera þarf rakakrem á bæði svæði í marga mánuði eftir aðgerð



By **doramarin**

[cheatography.com/doramarin/](https://cheatography.com/doramarin/)

Not published yet.

Last updated 24th September, 2022.

Page 2 of 2.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**

Learn to solve cryptic crosswords!

<http://crosswordcheats.com>