

### Samskipti við börn

#### Samskipti við ungbörn

*Nota og skilja fyrst og fremst óyrt boðskipti. Nærvera foreldra. Takmarka áreiti í umhverfi. Ná augnsambandi við barnið. Tala lágt og rólega. Meðhöndla barnið varlega en ákveðið. 6 mín gerir barn greinarmun á þeim sem það þekkir og ókunnugum*

#### Samskipti við smábörn og forskólabörn\*

*Gefa barninu tíma til að venjast umhverfinu. Leyfa barninu að skoða og snerta. Tryggja nærveru foreldra. Barnið er öruggast í fangi foreldra. Vera í augnhæð við barnið. Nota virka athyglisdreifingu. Vera skemmtilegur og uppörvandi*

#### Samskipti við smábörn og forskólabörn

*Segja barninu frá því sem við erum að gera og hvað það mun finna (lýsing, skynjun). Nota tungumál sem er í samræmi við þroska – einfaldar og stuttar setningar. Segja barninu hvað sé ætlast til af því Vanda orðanotkun. Gefa færi á að spyrja spurninga. Gefa val ef hægt. Segja barninu ef eitthvað verður sárt. Forðast að tala um alvarleg mál fyrir framan barnið*

#### Samskipti við skólabörn

*Hafa oftast næga reynslu tengda heilbrigðisstarfsfólki til að skilja hvað er að gerast og til hvers er ætlast. Tala beint við barnið. Vilja útskýringar og ástæður fyrir öllu. Hafa áhuga á því hvað er gert og til hvers hlutir eru notaðir. Ættu alltaf að fá að hjálpa til ef hægt. Nota þriðju persónu – gefur barninu færi á að tjá sig um áhyggjur "Mörg börn eru hrædd við að vera svæfð". Nota opnar spurningar*

#### Samskipti við unglunga

*Samskipti við unglunga. Aukins skilningur á heilsu og veikindum. Gefa unglungum færi á að hafa samskipti við hjúkrunarfræðing í einrúmi. Útskýra tilgang samskipta. Sýna áhuga – hlusta á unglunginn. Vera hreinskilin. Virðing – forðast að sýna vanþóknun eða vera hissa. Ganga úr skugga um að unglungur hafi skilið það sem sagt er.,Foreldrar og unglungar geta séð vandamálið frá ólíkum sjónarhornum*

### Samskiptaleiðir

Leikur – bangsar/dúkkur

Teikna, mála

Halda dagbók

Húmor – þegar á við

Menningarlegur munur

Segja sögu

Bækur, kvikmyndir, tölvuleikir

### Viðtal við fjölskyldu upplýsingasöfnun

Kynna sig

Útskýra tilgang viðtals

Næði

Opnar/lokaðar spurningar

Draga saman það sem sagt hefur verið

Fylgjast með samskiptamynstri fjölskyldu

Nota túlka

### Upplýsingasöfnun

Komuástæða

Lýsing á einkennum

Fyrri æðingarsaga ef nýbura-sjúkrasaga skeið

Almennt bólusetningar

heilsufar

Lyf

Ofnæmi

Virgni og hreyfing

Svefn

Næring

Útskilnaður

Fjölskyldusaga um sjúkdóma

Yfirfara hvert líkamskerfi

Sálfélaglegar upplýsingar

### Móttaka barna

### Móttaka barna (cont)

AVPU

GCS – aðlagður fyrir < 5 ára

Ljósop

Blóðsykur

### Vaxtarmælingar

lengd/hæð < 2 ára mæla liggjandi-mæla x 2

Höfuðummál mælt fyrir ofan eyru - mæla (< 2 ára) x 2

Þyngd börn < 1 árs berrigta, yngri börn í nærfötum/bleyju, eldri börn í léttum fötum.

### Almenn líkamsskoðun

Útbrot, bólgur, aflaganir, mar, eitlastækanir, kviðskoðun, hreyfingar og samhverfa útlíma

### Sjúkrahúsinnlögn

#### Helstu streituvaldar í sjúkrahúsumhverfinu

Aðskilnaður frá foreldrum, umönnunaraðila, vinum

Missir á stjórn og sjálfræði

Sársaukafull inngrip

Ótti við sársauka, skaða og aflögun líkama

#### Undirbúningur fyrir inngrip

Athuga skilning barnsins varðandi inngripið

Útskýra inngripið – miða við þroska barnsins

-Yngri börn stuttar einfaldar

útskýringar rétt fyrir inngrip

-Eldri börnum gagnast að fá tíma til að undirbúa sig

#### Kenna barninu aðferðir til að takast á við inngrip

Athyglisdreifing

Öndunaræfingar > 3 ára

Virkja foreldra – bæklingur um gagnlegar aðferðir

Staðeifyandi krem/plástra – bjóða alltaf upp á ef ástand barns leyfir

### Athyglisdreifing

---

## Almennt útlit og atferli

Atferli

Öndun

Litarhaft

## Mæling lífsmarka

Öndunartíðni og súrefnismettun

Hjartsláttartíðni

Blóðþrýstingur

Hiti

---

## Mat á meðvitund

---

---

C

By **doramarin**

[cheatography.com/doramarin/](https://cheatography.com/doramarin/)

Not published yet.

Last updated 31st October, 2023.

Page 1 of 3.

---

Sponsored by **Readable.com**

Measure your website readability!

<https://readable.com>

### Móttaka barna (cont)

Það er einn aðili sem sér um athyglisdreifinguna

Alltaf að vera með eitthvað nýtt tilbúið ef barnið missir athyglina

Virk athyglisdreifing virkar betur en óvirk

**Virk athyglisdreifing** Spila tölvuleik, blása sápukúlur

**Óvirk athyglisdreifing** Hlusta á tónlist, horfa á myndband, lesa bók, horfa á sápukúlur

### Stellingar

Yngri börn eru öruggust í fangi foreldra

Börn eru öruggari ef þau eru upprétt frekar en að liggja út af

### Ungbörn

Draga úr umhverfisáreyti

Súkrósa með/án snuðs

Staðdefandi plástrar/krem

Brjóstagiöf

Vefja/halda á barni/kangaroo care

Athyglisdreifing *Syngja, tónlist, leikföng með hljóði, ljósi eða títrung*

### Börn/unglingar

Nota staðdefandi krem/plástra

Athyglisdreifing miðuð við þroska

Öndunaræfingar frá 3 ára

Dáleiðsla – þarf sérstaka þjálfun

### Slæving

**Glaðloft frá 3 ára aldri** Krefst samvinnu barnsins

Virkar eftir 3 mín *verkun hættir fljótt eftir gjöf*

Frábendingar og höfuðáverkar, loftbr-s.s. andlits *jóst, hjatabilun ofl.*

Aukaverkanir *ógleði, uppköst, svimi*

**Slævandi lyf** midazolam, dexdemetomidin, klóral

### Slæving (cont)

Aukaverkanir paradoxical viðbrögð, öndunarþæling, erfiðara að fylgjast með meðvitund, lengra eftirlit

### Þroski og aðlögun

#### Aðgerðir sem styðja við þroska og aðlögun barna að sjúkrahúsinnlögn

Aðstaða fyrir foreldra þarfir foreldra

Leikstofa Sérþjálfað starfsfólk sem vinnur með barninu í gegnum leik

Sjúkrahústrúðar, skóli, kennarar

**Leikmeðferð (therapeutic play)** Barnið getur lært í gegnum leik um veikindi sín og sjúkrahúsumhverfið

*Leikur sem hefur þann tilgang að hjálpa barninu að takast á við streituvalda í sjúkrahúsumhverfinu*

1. Tjáningarform

2. Tilfinningaleg útrás

3. Gefur barninu færi á að ná stjórn á aðstæðum

### Sögur

Have the child make up a story about a picture. Analyze content and emotional clues in the story. Have children tell a story about an important experience in a group of other children.

### Teikningar

Ask the child to draw a picture about being in the hospital. Consider subject matter, size and placement of items in drawings, colors used, presence or absence of physical barriers, and general emotional feeling.

### Brúður

The puppets can ask questions of young children, who are often more likely to answer the puppet than a person.

### Lyfjagjafir barna

#### Lyfjagjafaleiðir

Nefdropar – nefúðar

Lyf um munn/melt-ingarveg mixtúrur, töflur, mylja lyf

Stílar

Eyrmadropar - augndropar

Innúðalyf

Stungulyf Undir húð, í vöðva, í æð

#### Lyf um munn/meltingarveg

*Spurja foreldra hvað gangi best – sum börn geta gleypst töflur mjög ung, öðrum finnst betra að taka mixtúrur og stundum er best að gefa stíl - finna leið í samráði við foreldra*

Magahnappur (Gastrostomy- tube/jejunos-tomy-tube)

#### Lyfjagjafir í vöðva hjá börnum

Ungbörn/S-mábörn < 3 vastus lateralis max 0,5 – 1 ml eftir stærð barns ára:

Forskólabörn/Skólabörn/Unglingar:

1. Vastus lateralis

2. Ventrogluteal

3. Deltoid (max 0,5 ml fyrir börn og 1 ml fyrir unglunga )

#### Lyfjafyrirmæli og lyfjagjafir

Lyfjaskammtar eru oftast gefnir upp sem mg/kg

*athuga að það er ákveðin hámarksskammtur með flest lyf d. lorazepam 0,1 mg/kg en hámarksskammtur er 4 mg þannig að börn > 40 kg fá 4 mg.*

Lyfjablanda mg/ml en stundum í µg/ml eða -þynning eða ng/ml

Athuga mixtúrur geta verið með ólíkan styrkleika d. Nurofen appelsin 40 mg/ml og ibufen mixtúra 20 mg/ml – þannig að alls ekki að fara eftir lyfjafyrirmælum sem tilgreina bara fjölda ml.