

| Sár sem ekki gróa | Sárameðferð | Sárameðferð (cont) | Sárameðferð (cont) |
|---|--|---|---|
| Til að sár geti gróið | Árangursrík sárameðferð | M - Raki moisture | Sárbarmar Sigg og dauð húð Bjúgur |
| Gott blóðstreymi (O2) að sárbeði | 1.Heilsufarssaga | E - Edge of wound | Merki um sýkingu |
| Raki og hlýja í sárbeði | 2.Greina undirliggjandi orsök sára | S - surrou-nding skin | TIMES: Tissue Hreinsun sára - debridement |
| Hreint sár Ekki dauður vefur né sýking | 3.Greina þætti sem tefja sárgræðslu | Staðlað mat á sárum | <i>Fjarlægja dauðan vef, bakteríur, óhreinindi og aðskotahluti</i> |
| Bráðasár / langvinn sár | 4.Skoða sárið sjálft og meta | Staðsetning | Autolysa/sjálfsleysing <i>Leið líkamans að hreinsa sár sjálfur með niðurboti. Til þess að þetta sé hægt þarf sár að vera rakt og umhverfið að vera súrt. Niðurbrotið skemmir ekki lífandi vef, það er sársaukalaust og tekur langan tíma.</i> |
| Bráðasár Skurðsár, slysasár, áverkar og brunasár | Áhrifaþættir sáragræðslu | Stærð Lengd, breidd, dýpt | |
| <i>Bráðasár koma fljótt og gróa yfirleitt fljótt ef aðstæður eru í lagi. Verða oftast vegna utanað- komandi áverka með eða án tilgangs.</i> | Einstaklingsbundir þættir: Heilsufar | Sárbotninn Litter og ástand vefja | |
| | <i>Blóðflæði, næring, sjúkdómar, lyf, sálfélagslegir þættir, hreyfi- geta, aldur, verkir, reykingar</i> | Útferð/vessi | |
| Langvinn sár Þrýstingssára, fótasár, skurðsár sem hafa opnast eða sýkst | Staðbundnir þættir: Sárið | Merki um sýkingu | |
| | <i>Rakastig, bjúgur, þrýstingur, áverkar, hitastig, bakteríur og drep</i> | Sárkantur | |
| | Hugtök í sárameðferð | Húðin í kringum sárið | |
| | Holistic wound assessment | Meðferð sára eftir tegund | |
| | Wound bed preparation | Skurðsár Frávik í eðlilegri sáragræðslu; <i>Sýking, blæðing og gliðnun</i> | |
| | TIMES | <i>Metum stærð sárs meira á dýptuna en umfangið en í krónískum sárum</i> | |
| | Holistic wound assessment | Áverkasár Hvers eðlis eru þau?; <i>Skurðir, stungur, kramni- ngsáverki, bruni?</i> | |
| | Hvað sé ég? | <i>Við slysaáverka þarf að meta starfshæfni, t.d. þarf að meta hvort sínar, æðar, taugar eða bein eru sködduð</i> | |
| | Hvaða þýðingu hefur það? | Sár sem ekki gróa | |
| | Hvað get í gert? | Stærð | |
| | Wound bed preparation | Sárabo-tninn | |
| | Gera aðstæður í sárabeði sem hagstæðastar til sárgræðslu með því að fjarlægja hindrandi þætti í sárabeðinu | | |
| | TIMES módel Dregur fram staðlað þætti í wound bed preparation | | |
| | T - tissue Vefur í sárabotni | | |
| | I - infection / inflam- mation | | |



Sárameðferð (cont)

Ediksyra Nýjar frumur drepast (fibroblastar)

Kalium-perman-ganat Sáravessi og gróftur draga úr virkni sótthreinsilausnar. Ofnæmi og erting

**

Þrýstingsumbúðir

Hvað er það? Teygubindi – Teygjusokkar

Virki þrýstingsumbúða

Styðja við vöðvapumpuna

Hindrar bláæðabakflæði

Minnka þvermál bláæðanna og auka flæðið um bláæðar

Bjúgur leitar minni bjúgur inn í æðakerfið aftur

Teygubindi – margar gerðir

Lítið teygjast allt að teygjanleg 90%

Mikið teygjast 90-140% teygjanleg

Marglaga þrýstingsumbúðir

Alltaf að vefja frá tábergi upp að hné a.m.k. Hafa ökklaðinn í 90° meðan vafið er og þekja hælinn. Um 40mmHg þrýstingur á að vera um ökklaðinn

Frábending fyrir notkun þrýstingsumbúða

Skert slagæðafhlæði

Skert skyntilfning mæning Sykursýki vegna taugakvilla og mænuskaðar

Sýking/Húðbeðsbólga

Þrýstingsumbúðir (cont)

Djúpbláæðatappi

Verkir

Hjartabilun

Áður en við vefjum: *Ganga úr skugga um að slagæðarennslí sé óhindrað*

Athuga hvort púls sé þreifa-nlegur

Mæla blóðþrýsting (systolu) og reikna ABI (ankle brachial index)

Ökkla Handleggs Þrýstingshlutfall

Systoliskur þrýstingur í ökkla/Systoliskur þrýstingur í handlegg 0,9 – 1,2

ABI

Má leggja þrýstingsumbúðir $\geq 0,8$

Tilvísun til æðaskurðlækni eða sáramiðstöðvar ABI < 0.8

Má ekki vefja með fullum þrýstingi undir 0,8

Teygjusokkar / þrýstingssokkar

Það má nota eftir að sár hefur gróið og er ævarandi meðferð sem dregur úr líkum á að sár myndist aftur

Sáragræðsla

Sáragræðsluferlið (3 fasar)

Bólgu fasi 3-6 dagar í bráðasárum Lengi lengi í langvinnnum sárum

Svörun æðakerfisins

Storknun + bólgusvörun

Niðurbrot + hreinsun

Frumufjölgunarfasi 3-21 dagur lengur í stórum langvinnnum sárum

Nýmyndun bandvefs (ör)

Samdráttur í sári

Þroskafasi Varir allt að 2 ár

Þekjun og styrking örvefjar

Merki um sýkingar í krónískum sárum

Sýking

Hiti (calor)

Roði >1-2cm (rubor)

Bólga (tumor)

Verkur (dolor)

KRÍTÍSK KOLONISERING

Stöðnun sáragræðslu

Viðkvæmur og blússandi rauður granulationsvefur

Aukin vessi og lykt

Nýir nekrósublettir

Sáraumbúðir

Gerðir umbúða

Umbúðir sem draga í sig vessa

Umbúðir sem ekki draga í sig vessa

Umbúðir sem eru loftþéttar

Umbúðir með bakteríudrepandi efni

Umbúðir með geli

Sáraumbúðir (cont)

Umbúðir sem festast ekki ofan í sári

Tegundir sáraumbúða

Svampar

Þörungar

Trefjar

Snertilag

Rakagel

Filmnur

Hydro-kolloidar

Hvenær á að nota hvað?

Hversu mikið vessar?

Er drep?

Hvernig er blóðrásin?

Er sýking?

Er lykt?

Sérhæfðar sáraumbúðir f. sár sem svara ekki meðferð

Bakteríudrepandi efni

Stoðefni (þorskröð)

Sáraso gsm-eðferð *Rök sáragræðsla í lokuðu umhverfi þar sem er sogað sáravessa úr sárinu. Það minnkar bjúg í sárabeði og minnkar umfangs sárs. Afleiðing er nýmyndun æða, flýting uppbyggingu granulationsvef og dregur úr sýking-ahættu*

| Fótasár og fótleggjasár | Fótasár og fótleggjasár (cont) | Fótasár og fótleggjasár (cont) | Fótasár og fótleggjasár (cont) |
|--|--|---|---|
| Langvinn sár fyrir neðan hné (fótasár og fótleggjasár) myndast oftast vegna undirliggjandi æðasjúkdóma og eða sykursýki | Orsök = Bláæðabilun (venous insufficiency) Óvirkar lokur, æðahnútar og segamyndun | Duplex eða sónar myndgreining, sem sýnir flæði í bláæðum fótleggja | Umbúðaskipti |
| Tegundir sára | Staðlað mat | Meðferð | Við skiptum á umbúðum eftir þörfum, en allt að daglega meðan mikið vessar. Þegar búið er að ná tökum á sáravessa er gott að skipta á umbúðum 1x í viku. |
| Bláæðasár | Staðsetning: | Hreinsun | Húðmeðferð fyrir bláæðasár |
| Sykursýkisár | Milli ökkla og hnés | Skola með kranavatni eða öðrum skolvökva eftir aðstæðum, leysa upp fibrinskán með sárageili. Stundum gott að nota sárasköfu eða pincettu. Milt sápuvatn til að hreinsa húð, skola með vatni á eftir | Exem Sterakrem |
| Slagæðasár | Stærð (Lengd, breidd, dýpt): | Umbúðir | Kaliumpermanganat fótáböð |
| Önnur fótasár | Yfirborðssár | Húðmeðferð | Vernda heila húð fyrir vessa |
| Þrýstingssár Immuno-logísk sár (æðabólga/vasculitis, iktsýki) Illkynja frumvöxtur | Sárbotninn | Meðhöndla veiklaða húð. | Zink áburðurm fljótandi film og zinkbindi |
| Greining og meðferð fótasára | Sárkantur | Umbúðir fyrir bláæðasár | ** |
| Saga | Óregluleg lögun | Sáraumbúðir með góða vessadrægni | Slagæðasár |
| Skoða | Útferð/vessi | Húðmeðferð | Orsakir |
| Þreifa | Húðin í kringum sárið: | Mikið fibrín | Slagæðakölkun |
| Hlusta | Einkenni | Mikill vessi | Þröngar slagæðar |
| Meta | Greining | Hrein, grunn | Skert slagæðaflæði |
| BLÁÆÐASÁR | Klínísk einkenni | Ser sem vessa lítið | Staðlað mat |
| | | | Staðsetning |
| | | | Yfir beinaber svæði; tær, jarkar, ökklaein og sköflungar |
| | | | Stærð (Lengd, breidd, dýpt): |
| | | | Djúp |
| | | | Sárbotninn |
| | | | Hvítur eða svartur líflaus sárbotn |
| | | | Sárkantur |
| | | | Vel afmörkuð |
| | | | Útferð/vessi |
| | | | Húðin í kringum sárið: |
| | | | Húð oft fölleit eða purpurarauð og köld. Seinkuð hárfylling |
| | | | Annað: Skert göngugeta v. verkja Hvíldarverkir |



Slagæðasár (cont)

| Einkenni | |
|------------|--|
| Fótapúlsar | Veikir eða ekki til staðar |
| Verkir | Miklir, í tám, hæl og rist. Verkir minnka ef fótur er látinn hanga |
| Húðskyn | Oft brenglað |
| Bjúgur | Stundum, sérstaklega ef fætur látnir hanga |

Staðbundin meðferð

| Hreinsun | |
|--|---------------------------------------|
| Markmið að þurrka sárin upp | |
| Ekki fjarlægja drep með hníf eða skærum | |
| Ekki skafa eða plokka í sárabotninn | |
| oSárin og húð í kring má skola þegar sj fer í sturtu | Þerra vel á eftir |
| Joðlausn ef blautt drep | |
| Umbúðir | |
| Þurrar umbúðir sem lofta | Bómullargrisjur eða non-woven grisjur |
| Ekki loftþéttar umbúðir | Drep á tám og fótum meðhöndlast þurr |

Slagæðasár (cont)

Þau þurfa að vernda fyrir áverkum og hnjaski, valda ekki þrýstingi og vera sveinjanlegar og mjúkar. Allt til að minnka skaða

Greining og meðferð

Vísu á sáramiðstöð / æðaskurðlækni ef grunur er um slagæðasár

Greining á ástandi æða (þræðing)

Æðaaðgerð Blásning og hjáveituaðgerð

Verkjameðferð

Þrýstingsumbúðir eða teygjusokkar eru FRÁBENDING nema í samráði við æðaskurðlækni

**

Sykursýkissár

Blönduð slagæða/bláæðasár

Orsakir

Taugaskemmdir með eða án blóðþurrðar

Taugaskemmdir (e. Neuropathy)

Neuropathic ulcer / Neuroischemic ulcer

Taugakvillar - neuropathy 5 aðal einkenni:

Minnkað skyn í fótum

Hita- og kuldatilfinning skert

Vöðvar rýrna

Liðir stífna

Minnkuð svitaframleiðsla

Staðlað mat

Staðsetning Iljar, táberg, hælur, jarkar, tær

Sykursýkissár (cont)

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Stærð | Djúp (oft opið inn að beini) |
| Sárakantur | Kringlótt |
| Húðin í kringum sárið | Sigg í kringum sár |

Einkenni

| | |
|------------|---|
| Saga | Stutt; dagar – vikur - mánuðir |
| Fótapúlsar | Stundum/stundum ekki |
| Bjúgur | Stundum |
| Verkir | Óljós verkjæin-kenni vegna taugaskemmda |

Aukin hættu á sýkingum

Það er aukin hættu þegar blóðsykur er hár, getur dreift sér hratt og það er mikilvægt að greina og meðhöndla fljótt

Aukin hættu á aflimun

Þeir sem eru með sykursýkisár MED blóðþurrð eru í meiri hættu á að sárin grói ekki og endi í aflimun.. Um 80% af aflimunum fyrir ofan ökkla, sem gerðar eru á Íslandi eru hjá einstaklingum með sykursýki og eða slagæðakölkun

Greining og mat

| | |
|-----------------------|--|
| Blóðflæði | |
| Sýking | |
| Beinkontakt | |
| Blóðsykursgildi | |
| Mat á skyntilfinningu | |

Meðferð

Sykursýkissár (cont)

| | |
|---|--|
| Aflétta þrýstingi af sárasvæði | bæklunarskór, spelkur, gifs, hækjur, hjólastól |
| Hreinsun | |
| <i>Fjarlægja sigg með hníf jafnt og þétt. Klippa upp dauða húð/blöðru. Fara varlega í að beita áhöldum við hreinsun sárbeðs</i> | |

Umbúðir

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Draga í sig vökva | |
| Draga úr sýking-urhættu | Sýkladrepani umbúðir; t.d. silfur |

Skipta um umbúðir og meta sár daglega til annan hvern dag

Mega ekki valda þrýstingspunktum

Hydrokolloidar bannaðir !!!

Ráðleggingar

Aldrei vera berfættur. Hella úr skóm.. Fótaaðgerðafræðingur reglulega. Fótaböð varasöm. Aldrei að nota rasp á harða húð. Setja krem á fætur – viðhalda raka í húð. Aðstoð við val á skóm

Greining og mat fótasára

BLÁÆÐASÁR

Staðsetning

Neðri fótleggur, oftast framanvert og innanvert, getur verið allan hringinn

Útlit

Yfirborðssár, óregluleg lögun, vessandi, granulerandi, oft fibrinskán. Exem á fótlegg, brúnleitar og hvítar skellur í húðinni kringum sárið

Sárasaga



| Greining og mat fótasára (cont) |
|---|
| Löng: Mánuðir – ár |
| Húðskyn |
| Eðlilegt |
| Fótapúlsar |
| Til staðar en erfitt að þreifa ef það er mikill bjúgur |
| Bjúgur |
| Já |
| Verkir |
| Oft |
| SLAGÆDASÁR |
| Staðsetning |
| Neðri fótleggur og fótur, á tám, á malleolus og öðrum beinaberum stöðum |
| Útlit |
| Vel afmörkuð, djúp með hvítan eða svartan sárabotn (drep). Ekki granulationsvefur |
| Sárasaga |
| Stutt: 2 Vikur – mánuðir |
| Húðskyn |
| Oft brenglað skyn ef blóðflæði er mikið skert |
| Fótapúlsar |
| Veikir eða ekki þreifaþlegir |
| Bjúgur |
| Stundum, ef fótur er látinn hanga |
| Verkir |
| Oft miklir verkir í tám, rist og hæl. Hvíldarverkir minnka ef fótur er látinn hanga |
| SYKURSÝKISSÁR |
| Staðsetning |
| Jarkar, tær, iljar |
| Útlit |
| Djúp, kringlótt, sárabotn oft rauður eða hvítur, sigg á köntum, oft sést í bein |

| Greining og mat fótasára (cont) |
|---|
| Sárasaga |
| Stutt: Dagar – vikur – mánuðir |
| Húðskyn |
| Skert |
| Fótapúlsar |
| Stundum til staðar |
| Bjúgur |
| Stundum |
| Verkir |
| Ekki í tengslum við sárið, oft áberandi litlir verkir miðað við dýpt sárs |
| IMMÚNÓLÍSK SÁR |
| Staðsetning |
| Á fótum eða fótleggjum, oft á utanverðum fótleggjum |
| Útlit |
| Vel afmörkuð og yfirleitt minni en bláæðasár. Sárin eru mjög rauð og jafnvel fjólublá í köntunum og í kringum sárið |
| Sárasaga |
| Stutt: Dagar – vikur |
| Húðskyn |
| Eðlilegt |
| Fótapúlsar |
| Til staðar |
| Bjúgur |
| Stundum |
| Verkir |
| Miklir verkir í sjálfu sárinu |
| Meðferð fótasára |
| BLÁÆDASÁR |
| <i>Æðahnútar, bláæðalokuleki, djúpur bláæðasegi</i> |
| Meðferð: |
| Rök sárameðferð |

| Meðferð fótasára (cont) |
|--|
| Sáraum- Svampar og búðir með þörungar góða vessad-rægni |
| Húðvernd <i>Meðhöndla exem með sterakremi. Vernda heila húð með zinksalva eða filmu</i> |
| Tíðni skiptinga |
| 1x í viku að jafnaði eða e. þörfum |
| Sýklalyf Yfirleitt ekki þörf |
| Ef S.aureus eða hemólýtískir streptokokkar ræktast; íhuga meðferð með Dicloxacillin, Cefalexin eða Clindamycin |
| SLAGÆDASÁR |
| <i>Æðakölkun og sykursýki</i> |
| Vísa til ef ABPI er ≤0,8 sárami- eða aðrar vísben- östöðvar dingar eru um skert eða blóðflæði æðasku- rölæknis |
| **Meðferð |
| Halda drepi þurru |
| Vernda núningi og þrýstingi gegn áverkum |
| Ekki loftþéttar umbúðir |
| Tíðni skiptinga 2 – 4x í viku eftir þörfum |
| <i>*Sýkin-garhætta</i> Mikil ef drep er blautt/mjúkt |

| Meðferð fótasára (cont) |
|--|
| Blönduð Gefa breiðvirk bakter- sýklalyf, t.d. íuflóra Augmentin eða Clindamycin og Ciprofloxacin |
| IMMÚNÓLÍSK SÁR |
| <i>Gigt, sýking og frumubreytingar</i> |
| Vísa á í húð- eða ónæmis- sárami- lækningum östöð eða til sérfræ- ðings |
| Meðferð |
| Rök sárameðferð |
| Lyfjameðferð með ónæmis- bælandi lyfjum nauðsynleg |
| Meta verki, gefa verkjalyf fyrir umbúðaskipti |
| Tíðni skiptinga Eftir þörfum |
| Sýklalyf Yfirleitt ekki þörf |
| Ef S.aureus eða hemólýtískir streptokokkar ræktast; íhuga meðferð með Dicloxacillin, Cefalexin eða Clindamycin |
| Meðferð eftir ástandi sárabeðs |
| Sár með drepi |
| Hreinsun Fjarlægja drep með hníf. Þvo með kranavatni og mildri sápu. |
| Umbúðir Gel og eða lokaðar loftþéttar umbúðir ef mýkja á upp dauða vefinn |

Meðferð eftir ástandi sárabeðs (cont)

Tíðni Daglega eða annan
skiptinga hvern dag til að byrja með

Þrýstings Forðast þær
umbúðir

Sýkt sár

Hreinsun Þvo með kranavatni og mildri sápu.

Umbúðir Umbúðir með silfri. Umbúðir sem hindra bakteríuvöxt

Tíðni Annan hvern dag
skiptinga eða daglega

Þrýstings Mælt með ef þær
umbúðir eiga við

Vessandi sár

Hreinsun Þvo með kranavatni og mildri sápu.

Umbúðir Vessadrægar umbúðir; svampar, þörungar, eða trefjar (vernda heila húð zink)

Tíðni Eftir þörfum. Þar til
skiptinga meðhöndlað

Þrýstings Mælt með ef þær
umbúðir eiga við

Granulerandi sár

Hreinsun Þvo með kranavatni – sápa óþörf

Meðferð eftir ástandi sárabeðs (cont)

Umbúðir Halda sári röku; svampar (stórt sár; íflutningur)

Tíðni Vikulega eða eftir
skiptinga þörfum

Þrýstings Mælt með ef þær
umbúðir eiga við

Þrýstingssárameðferð

Stig 1 Aflétta þrýstingi, ekki þörf á umbúðum

Stig 2 Aflétta þrýstingi, ekki drep, skolun, rök sárameðferð

Stig 3-4 Oft drepvefur, þá hreinsa með sköfu, hníf eða skærum. Rök sárameðferð

