

### Verkir eftir skurðaðgerð

**Bráðir verkir** Vöðvar, mjúkvæfir, bein, líffæri og taugaverkir.

Tíðni 48-88%

verkja á sjúkrahúsum

Tíðni verkja hjá skurðsjúklingum **Hærrí tíðni en hjá öðrum: 30-50% --> Meðal - mikilir**

**Algengi verkja** Rannsókn á Íslandi

Algengi 3/4 skurðsjúklingum voru með verki sl. sól

Styrkur Meðalstyrkur: 4,8. 1/4= 7-10

Sjúklinga-hópur Konur verri verki. Yngri með verri verki

Tími 10% af sólarhring

### Áhrif vanmeðhöndlaðra verkja

Andleg

Líkamleg Taugakerfi, stoðkerfi, hjarta og æðakerfi, innkirtla og efnaskipti, þvagfæri og meltingarkerfi, öndun og ónæmiskerfi.

Félagsleg

Stofnun og samfélag

#### Langvinnir verkir

*Vanmeðhöndlaðir verkir eftir skurðaðgerðir geta leitt til langvinnra verkja*

Algengi 10-50%

Styrkur Meðal miklir

Aðgerðir Algengt: Thoracotomy. (CABG, liðskiptaaðgerð og hnéskipti)

### PREOP áhættuþættir langvinnra verkja

Endurteknar skurðaðgerðir

Miklir verkir fyrir aðgerð

### Verkir eftir skurðaðgerð (cont)

Sjúkdómar Vefjagigt, sykursýki

Óbreyt-anlegir þættir Konur, yngra fólk, erfðir

Andlegir þættir Kvíði, örorka og hörmungarhyggja

Lífeðlisf-ræðilegir þættir Mikil bólga og verkjanæming

### PERI og POST OP áhættuþættir

Skurðaðgerð: Taugaskaði, skurðtækni, lengd aðgerðar

Meðferð: Geisla og lyfjameðferð

Andlegir þættir Kvíði, depurð og neuroticism

Miklir verkir eftir aðgerð Miklir Áhætta x3-10 meiri ef verkir eru meðal - miklir fremur en vægri fyrstu voku eftir aðgerð

*Tímalengd verkja skiptir meira máli en stök verkjaskot.*

### Aðrar aðferðir en lyf í verkjameðferð

Hugmyndafræði Verkir er meira en bara skynjun á sársauka

Verkjameðferð án lyfja Yfirleitt best að meðhöndla verki með bæði lyfjum og öðrum aðferðum

### Dæmi

Trufla verkjaboð Hliðarkenningin (gate control) *nudda olnboga*

Athyglisdreifing og breyta hugsun

Losa líkamlega- og tilfinningalega spennu

Losun endorfína

### Lyfjalausar verkjameðferðir eftir skurðaðgerðir

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) *Væg ráðlegging, meðal þekking, getur verið heppileg*

### Aðrar aðferðir en lyf í verkjameðferð (cont)

Slökun, leidd ímyndun, tónlist *Weak, öruggt, ekki ástæða til að nota ekki*

Fræðsla til sjúklings *Sterklega mælt með fyrir og eftir aðgerð*

Kuldi, nálast-ungur, nudd *Ófullnægjandi rannsóknarnámstöður*

#### Hita og kuldameðferð

*Passa að verja húð fyrir skaða og fylgjast með húð fyrir og eftir meðferð*

Rakur heitur bakstur Hámark 30 mínútur

Þurr heitur bakstur Hámark 30 mínútur

Kaldur bakstur Hámark 30 mínútur

VARÚÐ Sjúklingar með skert skyn

#### Slökun

Leiðbeina við slökun, hvetja slökun, stuðla að næði og meta árangur

#### Fleiri aðferðir

Hagræðing Aðstoða í þæginlega stöðu

Nudd Forðast svæði með sárum eða aumri húð

Tónlistar-meðferð Hvetja tónlist, meta líðan og viðbrögð við tónlist

Athyglisdreifing Dreifa athygli við sársaukafull inngrip

#### Hvað vilja sjúklingar vita?

Almennt um verkjameðferð

1. Lyfjalaus verkjastilling
2. Hversu miklir verkir og hversu lengi þeir vara
3. Hvern á að láta vita af verkjum
4. Hvernig verða verkir meðhöndlaðir við innlögn

Við útskrift{ac}}

1. Hvernig á að meðhöndla verki og hvað ef það dugur ekki

## Aðrar aðferðir en lyf í verkjameðferð (cont)

2. Aukaverkanir lyfja og fyrirbygging/meðhöndlun þeirra

3. Hvaða og hvernug verkjum má búast við

## Hjúkrunarmeðferð

## Hjúkrunaráætlun

Mat Skimun og verkjamat

Hjúkrunargreining Verkur og langvinnir verkir

Áætlun Meðferðarmarkmið í samráði v sjúkling

## Meðferð

Mat á árangri meðferðar

Endurmat á hjúkrunaráætlun

Meðferðarferli Mat - Endurmat - Meðferð

## verkja

Mat Verkjamat fyrir og eftir aðgerð

Tíðni 4 klst fresti fyrsta sólarhringinn skimunar eftir aðgerð. 1 sinni á vakt eftir það.

## Mat á verkjum fyrir aðgerð

Áætlun Ræða og skipuleggja verkja-meðferð fyrir aðgerð

## Fá fyrri verkjasögu

Fræðsla Matsaðferðir, verkjakvarðar, ábyrgð og mikilvægi að fyrirbyggja verki

Skráning Verkjamatstæki og markmið verkjameðferðar

## Verkjamat eftir aðgerð

Meta Staðsetningu, styrk, eðli og leiðni

Meta Í hvíld, við hreyfingu og við djúpöndun

## Mat á árangri verkjameðferðar

Lyfjagjöf í æð (IV) 15-30 mín

Lyfjagjöf undir húð (SC) 30-60 mín

## Hjúkrunarmeðferð (cont)

Lyfjagjöf um munn (PO) Klukkustund

Endurmat *Nota sama kvarða og áður*

Áhrif lyfja Verkjastilling og aukaverkanir

Áhrif annara meðferðar en lyfja

Áhrif meðferðar á virkni

*Endurmeta og aðlaga hjúkrunaráætlun*

## Meðferðaráætlun og verkjalyf

Hjúkrunargreiningar Byggja á verkjamatinu.

## Verkir

Einkenni Tjáir verkir, einkenni verkja, búast við verkjum (inngr, aðgerð, rannsóknir, ástand)

Orsakir Vefjaskaði og afleiðingar sjúkdóms/meðferðar

Meðferðaráætlun Einstaklingsbundin: Óskir sjúklings, fyrirmæli læknis, tegund/eðli verkja og aðgerðar

Meðferðarferli prótókollar Tengd ákveðnum aðgerðum

## Markmið meðferðar

Styrkur verkja NRS: undir 4 í hvíld og undir 6 við hreyfingu

Tryggja virkni Hvíld, hreyfing, næring og djúpöndun

Fyrirbyggja fylgikvilla Langvinnir verkir, skert hreyfigeta, erfiðleikar við öndun

Fyrirbyggja og meðhöndla aukaverkanir Ógleði, hægðatregða, öndunarslæving og kláði

## Verkjastjórnun

## Meðferðaráætlun og verkjalyf (cont)

Meta verki Staðsetning, styrkur, leiðni, áhrif á virkni. Í hvíld, við hreyfingu og hósta.

Matsaðferð Viðurkenndir skalar, óyrð tjáning, meðferð tekur mið af verkjamat og ástandi

Fyrirbygging Aukaverkanir verkjameðferðar

Meta meðferð Árangur verkjastillingar, aukaverkanir, áhrif á virkni og öndun

Tryggja verkjastillingu Fyrir hreyfingu og sársaukafull inngríp

Verkjalyfjagjöf Tekur mið af verkjamati og ástandi

## Samsett meðferð

Regluleg lyfjagjöf Fyrst eftir aðgerð og ef verkir eru stöðugir

Meta Verkjastillingu, aukaverkanir meðferðar, áhrif verkjameðferðar á virkni og öndun

## Fyrirbyggja aukaverkanir

## Samsett verkjameðferð (multimodal analgesia)

*Mismunandi aðferðir/lyf notuð til að meðhöndla verki og þannig ráðast að verkjum með mismunandi leiðum*

Kostir Betri verkjastilling með færri aukaverkunum. Minni óþægð (30-50)

## Meðferðarúrræði

Væg og bólgueyðandi verkjalyf

Óþjóf

Staðeyfilyf



By **doramarin**  
[cheatography.com/doramarin/](https://cheatography.com/doramarin/)

Not published yet.  
Last updated 12th September, 2022.  
Page 2 of 6.

Sponsored by **ApolloPad.com**  
Everyone has a novel in them. Finish  
Yours!  
<https://apollopad.com>

### Meðferðaráætlun og verkjalyf (cont)

Stoðlyf Ekki verkjalyf en hafa verkja-  
stillandi áhrif. T.d. flogaveik-  
islyf v. taugaverkjum

Aðrar aðferðir en lyf

### Væg og bólgueyðandi verkjalyf (NSAID)

*Hámarksskammtar sem valda hvorki þoli né  
fíkn*

Lyfhrif Hemja prostaglandin og eru  
bólgueyðandi

Áhrif Útlæg verkun og ennig verkun  
á MTK

#### Verkunarmáti

Verkjasti- Mikið notuð eftir skurða-  
llandi ðgerðir

Bólgue- Stærri skammta þarf en við  
yðandi verkjastillingu

Hitalækkandi

Blóðþy- Í litlum skömmtum. Hægja á  
nnandi blóðstorknum með að minnka  
samloðun blóðflagna

Notkun

Grunnlyf í meðferð eftir skurðaðgerðir

Notuð við Vægum verkjum (ein og sér),  
meðalsterkum verkjum  
(samhliða ópíóðum)

**NSAID:** *COX2 ekki áhrif á blóðflögur*  
**COX**

COX 1 Íbúfen, voltaren og toradol

COX 2 Celebra og dynastat

*Nota litlar skammta, nota stutt vegna  
aukaverkana, notað bæði bráð og langtíma  
meðferð, ekkert NSAID betra en annað,  
Cox 2 virkar vel post op*

Má nota Getur hægt á beingróanda  
eftir flestar langtíma. COX 1 má ekki gefa  
skurða- með utanbastlegg.  
ðgerðir

### Meðferðaráætlun og verkjalyf (cont)

#### Aukaverkanir

Höfuðverkur

Magaþp- Taka lyf með mat og vökva  
ægindi

Magabl- Saga um magabólgu/blæð-  
æðing ingar. Gefa prótonpumpuhemla  
með. Aukin hætta með lengri  
meðferð

Áhrif á Aldraðir og nýrnabilaðir. COX2  
nýrnas- æskilegri  
tarfsemi

Áhrif á Varúð ef saga um hjartaáfall.  
hjarta Yfirleitt ekki vandamál í stuttan  
tíma.

#### Sterk verkjalyf (ópíóðar)

Tegundir: Vægir ópíóðar + Sterkir ópíóðar

**Vægir** Tramadol (*tradolan, tramól*) og  
**ópíóðar** Kódín (*parkodin*)

**Sterkir** Morfín, metadon, fentanýl,  
**ópíóðar** cetobemidonium (Ketogan),  
hdyromorphone, oxycodone  
(oxycotin, oxynorm)

#### Notkun ópíóða

Notkun Meðal-miklir verkir. Í stuttan  
tíma. Eftir þörfum fyrri mikla  
verki.

Ekki Langverkandi post op verkja-  
mælt meðferð, verkjaplástrar  
með  
notkun

Fylgjast Slævingu og öndun. Háir  
með: skammtar geta framkallað  
hyperalgesiu

#### Notkun í verkjameðferð

Einstaklingsmeðferð

Þekkja verkunartíma

Meðhöndla aukaverkanir

### Meðferðaráætlun og verkjalyf (cont)

ATH þyngd ekki skammta eingöngu frá  
þyngd

#### Ópíóðar eftir þörfum

*Mikil einstaklingsmunur, verkjamat lykil  
atriði og styrkur verkja einn og sér segir  
EKKI til um hversu stóran skammt  
sjúklingur þarf*

Áhrifa- Aldur, kyn, sjúkdómstand og  
þættir kynþáttur  
virgni lyfja

Varúð Öndunarbílun og lífrar eða  
nýrnabílun.

Slævandi Minnka skammt beggja lyfja  
lyf um 30-50%

samhliða  
ópíóðum

#### Aukaverkanir ópíóða

Ólíkar Mismunandi viðtakar, ólíkar  
aukave- aukaverkanir milli lyfja; getur  
rkarnir milli þurft að skipta um lyf  
lyfja

Samsett Fleiri en eina tegund lyfja til  
meðferð að minnka ópíóðapörf

Lengd Flest minnka eða hverfa með  
aukave- tímanum  
rkana

#### Algengar eða alvarlegar aukaverkanir

Hægðatregða, ógleði, uppköst

Slen, öndunarslæving

Hreyi- og vitræn skerðing. Rugl, ofskynjanir  
Kláði

Þvagteppa

Munnþurrkur

#### Staðeiyfilyf

Lidocain, bupivacain og ropivacain

Lyfhrif Áhrif á hvíldarspennu og  
koma í veg fyrir taugaboð og  
verki

Mislangur verkunartími

Samverkun Með sterkum verkjalyfjum

**Notkun:**

### Meðferðaráætlun og verkjalyf (cont)

Yfirborðs-  
deyfing Þvagleggisetning, EMLA og aðrir plástrar.

Deyfing í lok aðgerðar

Taug eða  
taugastofn Aðgerðir á útlimum

Utan og innanbastsdeyfingar

#### Stoðlyf (coanalgesics)

Notum með  
verkjalyfjum Notuð við taugaverkjum

eða ein og  
sér

Geðlyf Þríhringlaga geðlyf,  
kvíðalyf, þunglyndislyf

Krampalyf;  
gabapentin Minnkar ópióðabörf ef  
gefið pre op, betri verkjasti-  
lling? og aukaverkanir

Sterar Minnka bjúg og bólgu.  
Hindra prostaglandin

### Gjafðaleiðir ópióða eftir skurðaðgerð

Um munn (PO) Hagkvæm, ódýr og  
örygg leið

Mikið notuð eftir skurðaðgerðir

Í endaparm (PR) Svipaðir skammtar og  
PO

Í æð (IV) Hraðvirkasta leiðin

Auðvelt að títra verkjalyf. Mikið notuð eftir  
skurðaðgerðir

Undir húð (SC) Mikið notuð leið

Hægt að nota pumpu til að gefa stöðugt

Í vöðva (IM) Ekki mælt með fyrir  
ópióða

Sársaukafullt, óþæginlegt, hætta á  
taugaskaða og sýkingum

Um húð (trans-  
dermal) Lítið notuð við verkjum  
eftir aðgerð

Langur tími að fullri verkun

Um slímhúð  
(transmucosal) Lítið notuð við verkjum  
eftir aðgerð

### Gjafðaleiðir ópióða eftir skurðaðgerð (cont)

Í nös eða um munnslímhúð

#### Sjúklingastýrð verkjastilling í æð (PCA)

Notuð til að meðhöndla allar gerðir af  
sársauka; algengast að gefa í æð eftir  
uppskurð

PCA dæla Skammtur, bið (delay, lo-  
ckout), tímatakmörk

Algengustu  
lyf Morfín og ketogan

Hluti af  
alhliða Til að not alægstu skammta  
verkja- sem verka og forðast aukave-  
meðferð rkanir

Markmið Ná stjórn á verkjum; ~~ekki~~  
PCA hugsað til að finna réttan  
skammt

Notkun Sjúklingur á að vera á undan  
PCA verknum

#### Hjúkrun í sjúklingastýrðri verkjameðferð

Meta styrk verkja, lífsmörk, hreyfigetu fóta,  
meðvitundarástand og aukaverkanir.

Meta NRS kvarði  
verkjasti-  
llingu og  
líðan

Meta AMK Meðvitund, öndunartíðni og  
x1 á vakt Spo

Fylgjast Stungustað og innrennsli snál  
með

Skrá Styrk verkja, BP, púls, ÖT og  
meðvitund

#### Eftirlit með öndunarbælingu

Slæving er undanfari öndunarbælingu

Fyrirbygging er lykilinn:

Margþætt verkjameðferð, fylgjast með  
meðvitundarstigi og öndun. Minnka ópióða-  
skammta ef meðvitund minnkar.

Auka eftirlit Fyrsta sól eftir aðgerð, við  
ef: hækkun á skammti, líffær-  
abilun, verið er að skipta um  
ópióða eða gjafaleið

### Gjafðaleiðir ópióða eftir skurðaðgerð (cont)

Mat á Pasero Opioid Induced  
meðvitund Sedation Scale (POSS)

0 (1) - Óhætt að gefa verkjalyf  
Vakandi/skýr

1 (2) - Óhætt. Hafa augun með  
Syfjaður/- þeim  
auðvelt að  
vekja

2 (3) - Mjög varlega í verkjalyf, Ath  
Sljór/hægt lífsmörk. Önnur lyf/minnka  
að vekja skammt.

3 (4) - Erfitt Grípa til aðgerða. Ekki meiri  
að vekja ópióða. Vekja og gera  
öndunaráætlun.

S - Sofandi Meta öndun, lífsmörk. Ath  
hrotur

#### Gjöf mótefnis (naloxonom)

##### Ábendingar

1. Meðvitundarlítil sjúklingar svara ekki  
áreiti

2. Öndun <8/mín

3. Pin point ljósop

##### Meðferð

Blöndu- 10 ml = 0,4mg þynnt í 9ml  
n/magn NaCl

Tíðni 0,5 ml IV á 2 mín fresti

Bráðatilfelli; 0,2 mg óþynnt

önduna-  
rsæving v.  
bráðverkjum

*Naloxonom hefur styttri helminungartíma en  
morfín og því gæti þurft að endurtaka gjöf/d-  
reypi*

Ef engin Athuga hvort einkenni stafa  
verkun eftir af öðru en ofskömmun  
0,8 mg ópióða

Sjúklingur Gefa non opioid verkjalyf  
vaknar og OG ópióða --> Helming af  
andar upphaflegum skammti við  
>9/mín verkjum

### Verkjastilling í mænugöng

<b>Spinal (intra-thecal)</b>	Subarachnoid svæði sem umkringir mænu
<b>Epidural</b>	Svæði milli veggja hryggjasúla og dura mater

### Vekjastilling í mænugöng

Algengustu lyf	Ópíóðar og staðdeyfilyf
Ópíóðar	Morfín og fentanyl
Algengar blöndur	Fentanyl, bupivacain og adrenalín
Staðsetning leggs	<i>Skammtar minni eftir því sem leggur liggur ofar</i>
<b>Eiginleiki lyfs</b>	Byggir á uppleysanleika
Vatsnelysanlegir ópíóðar (morfín)	Verka seint og lengi. Hafa rostral deifingu. Æskilegt lyf í mænugöng
Fituleysanlegir ópíóðar (Fentanyl)	Verka hratt og stutt. Dreifast lítið. Aukin upptaka í fituvef og blóð.
<b>Áhrif</b>	Bæði á skyn- og hreyfitaugar

### Aðferðir

#### Yfir stuttan tíma:

Einn skammtur í mænugöng, ein skammtur eða endurteknir skammtar utanbasts, síðreipi eða asjúklingastyrð (PCEA)

#### Langtíma meðferð

Leggur lagður inn, festur (tunnlaður) og tengdur við dælu

### Kostir og gallar

#### Kostir

Jöfn lyffjagjöf	Jafnari verkjastilling
Minni systematísk áhrif	Miðaði við gjöf PO eða IV

### Verkjastilling í mænugöng (cont)

Minni fylgikvillar;	Betri andleg líðan, dýpri öndun og minni áhrif á meltingu
---------------------	---

#### Gallar

##### Ífarandi meðferð

Aukaverkanir	Geta verið alvarlegar
--------------	-----------------------

##### Þörf á nákvæmu eftirliti hjúkrunarfræðings

Krefjast ákveðins tæknibúnaðs

#### Hjúkrunarmeðferð

Fylgjast með	Verkun og aukaverkun
--------------	----------------------

Skráning	Styrk verkja, lífsmörk (púls-, ÖT, BÞ, Meðvitund) og kláða. Tíðni: x4/sól fyrsta sól. Síðan x1/vakt.
----------	--

Skoða	Roði, vilsa, blæðing
-------	----------------------

stungustað daglega

Umbúðir	Ekki skipt nema þær losni
---------	---------------------------

Lyfjagjafasett	Ekki skipt
----------------	------------

Æðaleggur þarf að vera til staðar

Þvaglát	Fylgjast vel með eftir töku. Má taka degi 1 post op.
---------	--

Aukaverkanir	Kalla til svæfingu ef ber á miðlungs/alvarlegar aukaverknir af meðferðinni
--------------	--

#### Utanbastsmeðferð hætt

1. Lækka dreypishraða um 2 ml með amk 6 klst millibili

2. Óhætt að slökva á dreypi 2-4 ml/klst

Verkjastilling með þessu	Gefa verkjalyf 1-2 klst áður en slökkt á dreypi, gefa verkjalyf reglulega eftir epidural meðferð líkur.
--------------------------	---

### Verkjastilling í mænugöng (cont)

Ekki fjarlægja legg fyrir en	10-12 klst eftir eða 4 klst fyrir gjöf Klexans/fragmins. Hætta á blæðingu
------------------------------	---

Fylgjast með	BÞ og blæðingu
--------------	----------------

#### Aukaverkanir

*Mismunandi lyf = mismunandi aukaverkanir*

Ópíóðar	Kláði, ógleði, þvagteppa og hægðatregða
---------	---

Staðdeyfilyf	Geta valdið eitrunareinkennum
--------------	-------------------------------

<i>Staðdeyfilyf:</i> Hjarta	Dofi kringum munn, óreglu-elgur hjartsláttur, bradycardia og blóðsýring
-----------------------------	---

<i>Staðdeyfilyf:</i> MTK	Pirringur, krampar, kippir, óskýrt tal, járnbragð í munni, suð fyrir eyrum og hægt tal
--------------------------	--

Tilfærsla á utanbastslegg	Inn í utanbastsæðakerfið (innanskúms)
---------------------------	---------------------------------------

#### Utanbasts abcess

Utanbasts hematoma	Ekki gefa NSAID COX1 með utanbastsdeyfingu
--------------------	--

#### Öndunarbæling

#### Öndunarbæling eftir ópíóða

#### Áhættuhópar

Mjög ungir eða mjög aldraðir

Sjúklingur á róandi lyfjum

Sjúklingar með lungnavandamál

Sjúklingar með kæfisvefn

### Samantekt

#### Verkjamat

Einstaklingsbundin áætlun

Meðferð sem tekur mið af verkjamati	Fjölbætt + árangur meðferðar metin markvisst
-------------------------------------	--

Endurmat á áætlun

Fræðsla til sjúklings og aðstandenda

### Samantekt (cont)

Virkja þáttöku sjúklings í eigin meðferð

Hjúkrunarfræðingar gegna fjölþættu

hlutverki í meðferð verkja eftir skurðaðgerð

C

By **doramarin**

[cheatography.com/doramarin/](https://cheatography.com/doramarin/)

Not published yet.

Last updated 12th September, 2022.

Page 6 of 6.

Sponsored by **ApolloPad.com**

Everyone has a novel in them. Finish

Yours!

<https://apollopad.com>