

### Tablas y gráficos de frecuencias

`table(x)`

Tabla de frecuencias absolutas

`names(table(x))`

Nombres de las columnas de una tabla unidimensional

`z=factor(x, levels=1:7)`

`table(z)`

Si x contiene números que no sean 7, hacemos que el 7 también aparezca en la tabla de frecuencias.

`table(x)[4]`

Referirnos a tabla de frecuencias por el índice

`table(x)["5"]`

Referirnos a tabla de frecuencias por el nombre

`prop.table(table(x))`

Tabla de frecuencias relativas

`names(which(table(x)==3))`

Elementos cuya frecuencia = 3

`names(which(table(x)==max(table(x))))`

Moda

### Otros

`attach(empleados)`

`attr(empleados, "variable.labels") = NULL`

Eliminar etiquetas de columnas

### Gráfico de puntos

`dotchart(salario, xlab='salarios')`

`stripchart(salario~sexo, method='jitter')`

Salario según sexo

### Medidas de tendencia central

`as.numeric(names(which(table(edades)-==max(table(edades)))))`

Moda

`mean(edades)`

Media

`median(edades)`

Mediana

### Medidas de posición

`quantile(x, 0.1)`

Percentil

`quantile(salario)`

Todos los cuartiles

`quantile(salario, probs=c(0.25,0.5,0.75))`

`quantile(salario, probs=seq(0.1, 0.9, 0.1))`

Todos los deciles

`summary(x)`

R dispone de 9 métodos diferentes para calcular cuantiles, que se pueden especificar dentro de `quantile` con el parámetro `type`. En la mayoría de las ocasiones se obtiene el mismo resultado con todos los métodos, pero no siempre. Para saber en detalle las fórmulas que usa `quantile` para cada valor de `type`. El método que usa R por defecto si no especificamos otro es `type=7`.

### Medidas de dispersión

`diff(range(x))`

Rango

`IQR(x)`

Rango intercuatílico

### Medidas de dispersión (cont)

`var(x)`

Varianza

`sd(x)`

Desviación típica

`cv=sd(consumo)/abs(mean(consumo))`

Coefficiente de variación. nos permite, entre otras cosas, comparar dispersiones de variables medidas en diferentes unidades

`summary(subset(iris, Species=="setosa", c("Sepal.Length", "Petal.Length")))`

### Tablas bidimensionales de frecuencias

`Respuestas=c-`

`("No", "No", "Sí", "No", "Sí", "No", "No", "Sí")`

`Sexo=c("M", "M", "M", "H", "H", "H", "H", "H")`

`table(Sexo, Respuestas)`

Tabla bidimensional de frecuencias. El primer conjunto de valores es las filas y el segundo las columnas.

`t(table(Respuestas, Sexo))`

Intercambiar filas por columnas

`table(Respuestas, Sexo)[1,2]`

`table(Respuestas, Sexo)["No", "M"]`

Formas de referirnos a una tabla bidimensional

`prop.table(table(Sexo, Respuestas), margin=1)`

Frecuencias relativas marginales por filas

`prop.table(table(Sexo, Respuestas), margin=2)`

Frecuencias relativas marginales por columnas

`library(gmodels)`

`CrossTable(Sexo, Respuestas, prop.chisq=FALSE)`

Tabla de frecuencias absolutas y las tres tablas de frecuencias relativas de dos variables

### Tablas bidimensionales de frecuencias (cont)

```
colSums(table(Sexo,Respuestas))
```

| Sumar columnas

```
rowSums(prop.table(table(Sexo,Respuestas)))
```

| Sumar filas en tabla de frecuencias relativas

### Diagrama de barras

```
barplot(table(Sexo_Ger), col=c("lightblue","pink"), main="Title")
```

| Va alternando los colores indicados

```
barplot(prop.table(table(Respuestas)), main="Diagrama de barras de frecuencias relativas")
```

```
barplot(table(x), horiz=TRUE)
```

| Diagrama horizontal

```
barplot(table(Sexo,Respuestas))
```

| Dibujará una barra dentro de otra (el total) con distinto color según la primera variable

```
barplot(table(Sexo,Respuestas), beside=TRUE)
```

| Dibuja una barra al lado de otra

```
legend.text=TRUE
```

| Mostrar leyenda

```
legend.text=c("A","B")
```

| Cambiar texto leyenda

```
pie(table(Respuestas), main="Diagrama circular")
```

| Diagrama circular

```
par(mfrow = c(1, 3))
```

| Matriz de 3 filas donde se mostrarán las gráficas

```
tt <- table(cut(expprev, breaks=5))
```

```
tt <- table(cut(expprev, breaks=c(0,40,80,150,250,400)))
```

```
barplot(tt,xlab="Experiencia previa", main="Categorización en 5 clases")
```

| Uso con variables continuas

### Tablas multidimensionales de frecuencias

```
table(Sexo,Respuestas,Pais)
```

```
fable(Sexo,Respuestas,Pais)
```

| Tabla de frecuencias agrupando con tercera variable (la primera opción hace tres tablas, la segunda hace una)

```
fable(Sexo,Respuestas,Pais, col.vars=c("Sexo","Respuestas"))
```

| especificar qué variables queremos que aparezcan como filas o como columnas

```
table(Sexo,Respuestas,Pais)[,"H","Si","Italia"]
```

```
table(Sexo,Respuestas,Pais)[,,"Italia"]
```

```
table(Sexo,Respuestas,Pais)[,"M",,"Italia"]
```

| referimos a una entrada, o a una subtabla

```
prop.table(table(Sexo,Respuestas,Pais), margin=3)
```

| Tabla de frecuencias relativas marginales. Con axis = 3, vemos la frecuencia dentro de la tercera variable.

```
prop.table(table(Sexo,Respuestas,Pais), margin=c(1,3))
```

| De esta forma se suma según la primera variable dentro de cada país.

```
prop.table(fable(Sexo,Respuestas,Pais))
```

| Otra forma de mostrar la tabla de frecuencias relativas

```
apply(table(Sexo,Respuestas,Pais), MARGIN=c(1,3), FUN=sum)
```

### Tablas multidimensionales de frecuencias (cont)

```
apply(table(Sexo,Respuestas,Pais), MARGIN=2, FUN=sum)
```

| Aplicación de funciones

### Histograma

```
fruta=c(8,11,11,8,9,10,16,6,12,19,13,6,9,1-3,15,9,12,16,8,7,14,11,15,6,14,14,17,11,-6,9,10,19,12,11,12,6,15,16,16,12,13,12,-8,17,13,7,12,14,12)
```

```
plot(density(fruta), type="l", xlab="Número de árboles", ylab="Densidad", main="Densidad de la variable \"fruta\"")
```

| representar datos continuos (variables numéricas)



By **julenz**  
[cheatography.com/julenz/](https://cheatography.com/julenz/)

Published 20th November, 2022.  
Last updated 20th November, 2022.  
Page 2 of 2.

Sponsored by **ApolloPad.com**  
Everyone has a novel in them. Finish  
Yours!  
<https://apollopad.com>